

ATTUALITÀ E DISCUSSIONI

Curiosità floristica: *Montia fontana* L. subsp. *chondrosperma* (Fenzl) Walters

Questa pianta è stata indicata per la prima volta nel Distretto Euganeo da TREVISAN (1842), successivamente osservata e raccolta da BOLSON (1897-98) presso Montegrotto. BÉGUINOT (1909-14) la trova ai piedi di Monte Rosso e nelle zone umide circostanti il Castelletto (Torreglia), l'Autore inoltre ne sottolinea la rarità. Nel 2003 è stata da noi rinvenuta nelle stesse zone. Per la determinazione della sottospecie è necessario conoscere la morfologia del tegumento seminale. L'indagine al SEM, oltre ad aver permesso l'attribuzione alla sottospecie *chondrosperma*, ci ha rivelato una curiosa morfologia, infatti tra i vari semi più o meno rotondeggianti con ilo pronunciato, abbiamo osservato un curioso esemplare zoomorfo (Fig. 1).

Questa terofita scaposa, in fiore a maggio è un elemento corologico mediterraneo-subatlantico, è stata

raccolta ad una quota di circa 20 m s.l.m. in un versante esposto ad oriente, su un pendio sassoso costantemente umido per stillicidio, su substrato trachitico (PAD). Il suo interesse è essenzialmente conservazionistico visto la sua rarefazione e spesso la sua scomparsa in tutto il territorio italiano.

LETTERATURA CITATA

BÉGUINOT A., 1909-14 - *Flora Padovana*. Tipografia del Seminario, Padova.

BOLSON P., 1897-98 - *Catalogo delle piante vascolari del Venero di R. de Visiani e P.A. Saccardo*. Atti R. Ist. Ven. Sci. Lett. Arti, ser. 7,9: 43. Venezia.

TREVISAN V., 1842 - *Prospetto della Flora Euganea*. Padova.

(a cura di N. TORNADORE, M. BIASIOLO, M. BRENTAN)




Fig. 1
Seme al SEM di *Montia fontana* L. subsp. *chodrosperma* (Fenzl) Walters.